

Thalictrum rochebrunianum Ɖ»ŃŹƉ±Ɖ, Ń, Ɖ²Ɖ»Ɖ°Ɖ¶Ɖ½ŃfŃŹ Ɖ¿Ɖ¾Ń†Ɖ²Ńf, Ɖ±Ɖ¾Ɖ³Ɖ°Ń,ŃfŃŹ Ɖ³ŃfƉ¼ŃfŃ•Ɖ¾Ɖ¼, Ɖ»ƉµƉ³Ɖ°Ɖ¾Ɖµ Ɖ•Ɖ°Ń,ƉµƉ½ƉµƉ½Ɖ,Ɖµ Ɖ² Ɖ¶Ɖ°Ń€Ɖ°Ɖ¾Ɖ¼ Ɖ°Ɖ»Ɖ,Ɖ¼Ɖ°Ń,Ɖµ. Thalictrum rochebrunianum Ɖ,Ɖ´ƉµƉ°Ɖ»ŃŒƉ½Ɖ¾ Ɖ¿Ɖ¾Ɖ´Ń...Ɖ¾Ɖ´Ɖ,Ń, Ɖ´Ɖ»Ń• Ɖ•Ɖ¾Ɖ½ USDA 6-7, Ɖ½Ɖ¾ Ɖ²Ń«Ɖ¶Ɖ,Ɖ²ƉµŃ, Ɖ, Ń•ƉµƉ²ƉµŃ€Ɖ½ƉµƉµ, Ɖ´Ɖ¾ 4 Ɖ•Ɖ¾Ɖ½Ń¿, Ń• Ɖ±Ɖ¾Ɖ»ƉµƉµ Ɖ°Ɖ¾Ń€Ɖ¾Ń,Ɖ°Ɖ,Ɖ¼ Ń•ƉµƉ•Ɖ¾Ɖ½Ɖ¾Ɖ¼ Ń†Ɖ²ƉµŃ,ƉµƉ½Ɖ,Ń•.

ƉœƉ¾Ń€Ɖ¾Ɖ•Ɖ¾Ń•Ɖ¾Ɖ¹Ɖ°Ɖ¾Ń•Ń,ŃŒ: 5-8 Ɖ•Ɖ¾Ɖ½Ń¿ USDA.Ā



ƉžƉ¿Ń€ƉµƉ´ƉµƉ»Ɖ,ŃŒ Ɖ•Ɖ¾Ɖ½Ńf USDA Ɖ´Ɖ»Ń• Ɖ¼Ɖ¾ƉµƉ³Ɖ¾ Ń€ƉµƉ³Ɖ,Ɖ¾Ɖ½Ɖ° (Ɖ² Ɖ½Ɖ¾Ɖ²Ɖ¾Ɖ¼ Ɖ¾Ɖ°Ɖ½Ɖµ)

Ɖ Ɖ°Ɖ•Ɖ¼Ɖ½Ɖ¾Ɖ¶ƉµƉ½Ɖ,Ɖµ Ń•ƉµƉ¼ƉµƉ½Ɖ°Ɖ¼Ɖ,

Ɖ´Ɖ»Ń• Ɖ´Ń€ŃfƉ¶Ɖ½ŃŃ... Ɖ²Ń•Ń...Ɖ¾Ɖ´Ɖ¾Ɖ² Ɖ½ƉµƉ¾Ɖ±Ń...Ɖ¾Ɖ´Ɖ,Ɖ¼Ɖ° Ń•Ń,Ń€Ɖ°Ń,Ɖ,Ń,Ɖ,Ɖ°ƉŃ†Ɖ,Ń•. Ɖ ƉµƉ°Ɖ¾Ɖ¼ƉµƉ½Ɖ´ŃfƉµƉ¼Ɖ°Ń• Ń•Ń...ƉµƉ¼Ɖ°: 3 Ɖ½ƉµƉ´ƉµƉ»Ɖ, +22 Ɖ³Ń€Ɖ°Ɖ´, 6 Ɖ½ƉµƉ´ƉµƉ»ŃŒ +3..+5 Ɖ³Ń€Ɖ°Ɖ´, +22 Ɖ³Ń€Ɖ°Ɖ´. ƉŸŃ€Ɖ¾Ń€Ɖ°Ń•Ń,Ɖ°Ɖ½Ɖ,Ɖµ Ɖ½Ɖ° 3-6 Ɖ´ƉµƉ½ŃŒ.